



**CLASSE A002 - ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E LABORATORIO DI MISURE
OFTALMICHE**

Anno Accademico 2014/2015

- 1. La puntura evacuativa nell'intervento di DDR deve essere eseguita in un punto dove il liquido sottoretinico:**
 - A) è abbondante
 - B) è scarso
 - C) è assente
 - D) è fluido

- 2. Nei distacchi retinogeni, le rotture retiniche non sono provocate da trazione vitreale ma sono legate:**
 - A) a degenerazione retinica
 - B) a processi infiammatori
 - C) a invecchiamento
 - D) ad aderenze vitreoretiniche

- 3. Nelle forme di uveite cronica posteriore, come risulta lo spessore della coroide all'OCT?**
 - A) Ridotto
 - B) Uguale alla forma acuta
 - C) Aumentato
 - D) Nella norma

- 4. La membrana amniotica costituisce:**
 - A) lo strato interno della placenta
 - B) lo strato esterno della placenta
 - C) lo strato basale del miometrio
 - D) lo strato distale della dura madre

- 5. Quale nervo oculare possiede fibre simpatiche?**
 - A) III n.c.
 - B) IV n.c.
 - C) II n.c.
 - D) VII n.c.

- 6. Le metamorfopsie nel distacco posteriore di vitreo sono legate a:**
 - A) edema maculare trazionale
 - B) edema papillare
 - C) edema corneale
 - D) edema cerebrale

- 7. Quale muscolo extraoculare è innervato dal IV nervo cranico?**
 - A) Obliquo superiore
 - B) Retto inferiore
 - C) Retto superiore
 - D) Obliquo inferiore

8. L'escissione di uno pterigio può provocare:

- A) astigmatismo
- B) ipertono oculare
- C) diplopia
- D) ipermetropia e diplopia

9. La verruca è una lesione:

- A) virale
- B) batterica
- C) micotica
- D) tubercolare

10. L'occlusione di una branca venosa retinica si verifica più frequentemente:

- A) al livello in cui l'arteria incrocia la vena
- B) a livello della lamina cribrosa
- C) a livello della diramazione capillare periferica
- D) a livello della lamina cribrosa e della diramazione capillare periferica

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)